

제왕절개 수술 중 양쪽 난관절제술

제왕절개란 무엇인가요?

제왕절개 분만(제왕절개 수술) 중에 아기는 배(복부)와 자궁에 절개된 외과적 절개(절단)를 통해 분만됩니다. 일부 환자들은 제왕절개 시 향후 임신을 영구적으로 예방하기 위해 수란관 나팔관(난관절제) 또는 절제술(양쪽 난관절제술)을 선택합니다.

양쪽 난관절제술(sal-pin-JEK-tuh-me)이란 무엇입니까?

양측 난관절제술은 양쪽 나팔관을 제거하는 수술입니다. 나팔관은 난소와 자궁을 연결합니다. 난소에서 나온 난자는 나팔관을 통해 자궁(자궁)에 도달합니다. 양측 난관절제술은 나팔관만 제거하기 때문에 난소와 자궁은 제자리에 그대로 둡니다.



여성 해부학적 생식 시스템

저작권 © 2025 Blausen Images

제왕절개 수술 중 양쪽 난관절제술을 왜 해야 합니까?

- 나팔관 및 난소암 발생 가능성을 낮추기 위해
- 미래의 임신을 영구적으로 예방하기 위해

난소암이란 무엇인가요?

난소암은 난소 조직에서 발생할 수 있습니다. 최근 대부분의 난소암은 난소가 아닌 나팔관에서 발생한다는 사실을 알게 되었습니다.

평생 동안 난소암에 걸릴 위험은 약 78 분의 1 입니다. 난소암으로 사망할 확률은 약 108 분의 1 입니다. 매년 약 20,000 명의 사람들이 난소암 진단을 받습니다. 난소암 진단을 받은 대부분의 사람들은 5 년 이내에 사망할 것입니다.

난소암 검진을 받을 수 있나요?

난소암에 대한 선별 검사는 없습니다. 펄 테스트는 난소암 검사를 하지 않습니다. 마찬가지로, 초음파와 같은 영상 연구는 난소암을 선별하지 않습니다.

나팔관 절제 포함 제왕절개 수술

제왕절개(제왕절개 수술)로 아기를 출산한 후 양측 난관절제술을 선택할 수 있습니다. 동일한 절개를 통해 이루어집니다. 대부분의 경우 양측 난관절제술은 몇 분 더 걸리고 회복 시간이 늘어나지 않습니다.

연구에 따르면 양측 난관절제술과 양측 난관결찰(관이 묶여 있는 경우)로 인한 합병증의 위험이 낮다고 합니다.

제왕절개 시 난관절제술의 이점

- 영구 피임
- 난소암 위험 감소
- 영구 피임을 위한 두 번째 수술보다 더 비용 효율적입니다
- 회복 시간을 추가하지 않습니다
- 난관결찰에 비해 계획되지 않은 임신과 이소성 임신의 위험이 낮습니다.

제왕절개 시 나팔관 절제술을 받을 때 고려해야 할 위험 및 사항

- 추가적인 수술 복잡성
- 더 긴 수술 시간(평균 8 분)
- 난관결찰에 비해 출혈 위험이 적을 가능성이 있습니다. 한 연구에 따르면, 출혈 위험은 나팔관 절제술의 경우 3.8%, 난관결찰술의 경우 3.1%로 나타났습니다.
- 대부분의 연구에 따르면 나팔관을 제거해도 조기 폐경이 발생하지 않습니다. 난소가 제자리에 있기 때문입니다.
- 양쪽 난관절제술은 난소암 위험을 줄이는 데 매우 효과적입니다. 난소암의 위험을 완전히 제거하지는 않습니다. 이는 일부 난소암(20% 미만)이 실제로 난소에서 시작되기 때문입니다.
- 가능성 있는 유감스러운 상황입니다. 난관결찰술과 나팔관 절제술은 모두 영구적인 피임 방법입니다. 나팔관 절제술은 되돌릴 수 없습니다. 많은 경우에 난관결찰술도 되돌릴 수 없습니다.

왜 중요합니까?

난소암은 여성에게 가장 치명적인 5 대 암 중 하나입니다. 신뢰할 수 있는 선별 검사가 없습니다. 일부 사람들은 양쪽 나팔관을 제거하여 위험을 낮추기로 선택합니다.

이 정보는 전문 의료 서비스를 대체하기 위한 것이 아닙니다. 항상 의료 전문가의 지시를 따르십시오.