Bilateral Salpingectomy to Reduce Risk of Ovarian Cancer – Korean



양쪽 난관절제술은 난소암 위험을 줄이는 데 매우 효과적입니다.

양쪽 난관절제술(sal-pin-JEK-tuh-me)이란 무엇입니까?

난관 절제술은 한쪽 또는 양쪽 나팔관을 외과적으로 제거하는 것을 말합니다. 나팔관은 난소와 자궁을 연결합니다. 난소에서 나온 난자는 나팔관을 통해 자궁(자궁)에 도달합니다.

연구에 따르면 난소를 제자리에 두고 나팔관을 제거하면 난소암 위험이 많이 감소하는 것으로 나타났습니다.이는 가장 흔하고 치명적인 난소암이 실제로 나팔관에서 시작되기 때문입니다.

양측 난관 절제술이 저에게 선택 사항인가요?

양측 난관 절제술은 양쪽 난관을 제거하는 영구적인 피임 옵션입니다. 다른 복부 수술 중에도 종종 시행할 수 있습니다.

귀하의 난소암에 대한 독특한 위험성과 양측 난관 절제술이 귀하에게 선택 사항인지에 대해 외과의사와 상담하세요.



저작권 © 2025 Blausen Images

난관 절제술 후 결과는 어떻게 되나요?

- 이 절차는 나팔관과 난소암의 위험을 줄여줍니다.
- 불임을 위해 나팔관이 필요하지 않은 사람들을 위한 영구적인 피임 방법입니다. 양쪽 나팔관을 제거한 후에는 체외 수정(IVF)을 통해서만 임신이 가능합니다.
- 대부분의 연구에 따르면 나팔관을 제거해도 조기 폐경이 발생하지 않는 것으로 나타났습니다. 난소가 제자리에 있기 때문입니다.

양쪽 난관절제술의 위험성은 무엇입니까?

모든 수술에는 어느 정도의 위험이 따릅니다. 난관절제술은 저위험 시술입니다. 합병증에는 다음이 포함될 수 있습니다:

- 출혈
- 탈장
- 복부 장기 손상
- 마취 부작용
- 중이염
- 반흔 조직
- 만성 통증

양쪽 난관절제술에 대해 자세히 알아보려면 이 동영상을 시청하세요. 휴대전화의 카메라를 사용해 QR 코드를 스캔하십시오.

이 정보는 전문 의료 서비스를 대체하기 위한 것이 아닙니다. 항상 의료 전문가의 지시를 따르십시오.

저작권 © 2025 Johns Hopkins University

마지막 개정일 2025년 10월 7일