#### Salpingectomy - An Overview - Simplified Chinese



# 输卵管切除术—概述

## 什么是输卵管切除术 (sal-pin-JEK-tuh-me)?

输卵管切除术是通过外科手术的方式,切除一侧或双侧输卵管。输卵管起着连接卵巢和子宫的作用,卵 巢排出的卵子会经输卵管进入子宫(子宫腔)。 而输卵管通常是精子与卵子相遇并完成受精过程的场所。

有些人选择切除双侧输卵管(双侧输卵管切除术),将其作为永久性的避孕手段,同时降低患卵巢癌的风 险。相关研究表明,保留卵巢、仅切除输卵管,能够显著降低患卵巢癌的几率。 这是因为大多数常见且 致命的卵巢癌,实际上其起源部位是输卵管。此外,输卵管切除术也可能被推荐用于治疗异位妊娠或感染。

#### 不同类型输卵管切除术概述

输卵管切除术的具体类型,取决于实施手术的原因。

- **部分输卵管切除术**:切除部分输卵管组织。由于卵巢得以保留,卵巢仍能正常分泌雌激素和其他激素,因此您的月经不会受到影响。
- **完全输卵管切除术**: 完全切除一侧(单侧)或两侧(双侧)输卵管。由于卵巢得以保留, 卵巢仍能正常分泌雌激素和其他激素, 因此您的月经不会受到影响。
- 输卵管卵巢切除术 (oof-er-ect-uh-mee): 切除一侧或 双侧输卵管和卵巢。若双侧卵巢均被切除,患者将进 入更年期
  - 被切除。 若仅切除 一 侧卵巢,剩余的卵巢可能会分泌足够的激素,避免患者提前进入更年期。女性至少需要保留 一 侧输卵管和 一 个卵巢,才具备怀孕能力。
- **保留卵巢的输卵管切除术**: 仅切除输卵管。 由于卵 巢得以保留,卵巢仍能正常分泌雌激素和其他激素, 因此您的月经不会受到影响。



女性生殖系统解剖结构 ©2025 Blausen Images 版权所有

• 降低卵巢癌风险的双侧输卵管切除术:在患者接受 其他腹部手术(如胆囊手术、疝气手术、剖宫产或子宫切除术)时,可选择性地进行双侧 输卵管切除。这一做法通常被称为"机会性输卵管切除术",对于无需依靠输卵管实现生 育功能的人群而言,这是一个降低患输卵管癌、卵巢癌和腹膜癌风险的有利时机。

## 为什么推荐进行输卵管切除术?

 癌症预防 — 大多数常见且致命的卵巢癌,实际上其起源部位是输卵管。相关研究证实,保留卵巢、仅切除输卵管,能够在不引发患者更年期的前提下,降低患卵巢癌的风险。 卵巢癌是最危险的癌症类型之一。我们无法对其进行筛查。通常情况下,卵巢癌在确 诊时往往已发生扩散,治疗效果也不尽如人意。

- **永性避孕** 双侧输卵管切除术(切除双侧输卵管)是一种永久性的避孕手段。在接受双侧 输卵管切除术后,若想实现妊娠,唯一可行的方式是借助体外受精 (IVF)。
- 异位妊娠 异位妊娠指的是受精卵在子宫腔以外的部位着床发育。当异位妊娠发生在输卵管内时,胚胎无法正常发育成胎儿。这种情可能会导致输卵管破裂。而输卵管破裂会严重危及生命。为防止异位妊娠引发的大出血情况,可能需要进行输卵管切除术,以切除受影响的输卵管。
- **其他原因** 输卵管切除术可能被推荐用于治疗囊肿、扭转(输卵管和卵巢发生扭转)、 感染、瘢痕组织及其他病症。

#### 卵巢癌从哪里开始?

卵巢癌既可能起源于卵巢,也可能起源于输卵管。科学家近期研究发现,<u>大多数卵巢癌实际上起源于输卵</u>管,随后才扩散至卵巢。不过,由于存在一些罕见的卵巢癌类型,其起源部位为卵巢,所以即便切除了输卵管,仍有患上这些罕见卵巢癌的可能性。

#### 部分人群患卵巢癌的风险相对更高。

大多数被诊断出患有卵巢癌的患者,并没有明显的已知风险因素。以下情况可能会增加个体患卵巢癌的风险:

- 存在卵巢癌家族病史
- BRCA1 或 BRCA2 基因突变检测结果呈阳性
- 患有其他会增加卵巢癌发病风险的遗传性疾病,例如林奇综合征
- 患有子宫内膜异位症
- 未曾有过妊娠经历
- 未曾进行过母乳喂养
- 未曾使用过激素类避孕措施(例如口服避孕药)
- 月经初潮时间较早(12 岁之前)
- 绝经时间较晚(52岁之后)
- 有过盆腔放射治疗史

## 能进行卵巢癌筛查吗?

不能。目前尚无有效的卵巢癌筛查检测方法。巴氏涂片检查不能用于筛查卵巢癌,影像学检查(例如 超声)也无法对卵巢癌进行筛查。

## 是否存在能预防卵巢癌的手术?

是的,双侧输卵管切除术可降低患卵巢癌的风险。 它是指通过外科手术的方式,将双侧输卵管予以切除。 患者可以选择在接受其他腹部或盆腔手术时,一并完成双侧输卵管切除术。与输卵管结扎术(仅结扎输 卵管而不进行切除)相比,双侧输卵管切除术是更为有利的手术选择。 相关研究表明,保留卵巢、仅切 除输卵管,是降低患卵巢癌风险的最有效方法之一。大约 80% 最常见且致命的卵巢癌,都起始于输卵管。

### 双侧输卵管切除术后会产生哪些结果?

- 降低输卵管癌和卵巢癌的风险。
- 永久性避孕 —— 切除双侧输卵管后,只有通过体外受精 (IVF) 才能怀孕。
- 大多数研究表明,切除输卵管不会导致早发性绝经。这是因为卵巢被保留了下来。
- 仍会持续产生激素。
- 因此您的月经不会受到影响。

# 我是否适合通过双侧输卵管切除术来降低患卵巢癌的风险?

如果您未来没有通过输卵管实现生育的需求,那么双侧输卵管切除术或许是一个可行的选择。建议您与医生进行沟通,了解自身患卵巢癌的独特风险因素,以及这项手术是否适合您。

## 双侧输卵管切除术的风险和并发症

任何手术都存在一定风险。双侧输卵管切除术属于一项低风险手术。一些可能但不常见的并发症包括:

- 出血
- 疝气
- 腹部器官损伤
- 感染
- 瘢痕组织
- 慢性疼痛

获取更多 信息!

若您希望了解更多关于机会性输卵管切除术的信息,可以观看相关视频。请使用手机摄像头扫描二维码。



本信息不能替代专业的医疗护理服务。请务必遵循医疗专业人员的指示。

©2025 Johns Hopkins University 版权所有